



Diabetiker

Sans gluten
ni lactose

Complément alimentaire

Nutrition spéciale pour diabète sucré sous régime

Doppelherz® aktiv Diabetiker a été développé spécialement pour les personnes sous régime diabétique chez lesquels il est retrouvé assez fréquemment une insuffisance en vitamines et en minéraux. **Doppelherz® aktiv Diabetiker** est une combinaison spéciale de vitamines, de magnésium minéral et d'oligo-éléments (zinc, chrome et sélénium).

Les Vitamines du groupe B: B₁, B₂, B₆, B₁₂, acide pantothénique, la biotine et l'acide folique sont essentiels pour le métabolisme des glucides. Ils sont impliqués dans tous les métabolismes importants.

Minéraux: Le magnésium, le zinc, le chrome et le sélénium jouent un rôle important dans l'équilibre de la glycémie, soit dans la synthèse ou dans l'efficacité de l'insuline. Le magnésium est bien connu pour son effet positif sur les muscles dont la carence se manifeste souvent en cas de diabète.

Les antioxydants: Les vitamines C et E protègent les cellules des réactions néfastes des radicaux libres qui sont augmentés en cas de troubles métaboliques.

Un comprimé de **Doppelherz® aktiv Diabetiker** est une combinaison importante et équilibrée de vitamines, minéraux et oligo-éléments spécialement conçue pour diabétiques.

Composition: Vitamine B₁, vitamine B₂, vitamine B₆, vitamine B₁₂, acide folique, vitamine C, vitamine E concentrée, biotine, calcium pantothénate, nicotinamide, oxyde de magnésium, gluconate de zinc, chlorure de chrome (III) hexahydrate, sodium sélénate, amidon de riz, eau, huile d'olive, cellulose microcristalline (agent de charge, 7.32 %), mono- et di-glycérides d'acides gras (émulsifiant, 3.82 %), silice amorphe (antiagglomérant, 2.78 %), hydroxypropyl-méthyl-cellulose (épaississant, 1.75 %), gomme arabique (émulsifiant, 1.22 %), sels d'acide stéarique (antiagglomérant, 0.75 %), gomme laque (agent d'enrobage, 0.49 %), bioxyde de titane (colorant, 0.28 %), talc (antiagglomérant, 0.19 %), monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane 20 (émulsifiant, 0.05 %), oxyde de fer jaune (colorant, 0.02 %).

Conseils d'utilisation: Prendre 1 comprimé par jour au repas avec suffisamment de liquide sans mâcher. Les comprimés peuvent être divisés en deux si nécessaire. Pour un meilleur résultat, **Doppelherz® aktiv Diabetiker** doit être pris pendant une longue période.

Remarques: Ne pas dépasser la posologie recommandée. Les compléments alimentaires ne peuvent pas se substituer à une alimentation équilibrée et variée. Tenir hors de la portée des enfants.

Il ne peut être utilisé à la place du régime diabétique! Les recommandations du médecin doivent être respectées y compris en prenant la dose recommandée de médicaments, l'activité physique et l'observation d'une alimentation adaptée aux diabétiques.

Valeur énergétique: 1 comprimé correspond à 1 kcal/4 kJ.

A conserver à une température inférieure à 25 °C.




Queisser
PHARMA

GmbH & Co. KG
24914 Flensburg
Allemagne
email: info@queisser.de
www.doppelherz.com